

CATECOLAMINAS EN PLASMA

Description

Meta Fields

Utilidad Clínica :

Diagnóstico y tratamiento de pacientes hipertensos, sospechosos de presentar tumores de cresta neural, médula suprarrenal y tejidos extramedulares de la suprarrenal; evaluación de pacientes con hipertensión ortostática.

Preparacion Del Paciente :

El paciente debe suspender el uso de medicamentos u otras sustancias que interfieren con la prueba una semana antes, a saber: alfa-metildopa, mandelato de metenamida, isoprotenol y labetol. También debe abstenerse de fumar, tomar café o té 4 horas antes de la toma de la muestra. El paciente debe permanecer en reposo 30 minutos antes de la toma de la muestra en posición supina.

Tiempo Entrega Resultados : 15 días

Dias De Procesamiento : Semanal (REMITIDO A LA RED DE APOYO)

Interferencias :

Hemolisis

Estabilidad Y Preparacion :

2 meses a -20°C

Tipo De Muestra :

Plasma con EDTA – 3mL

Sinonimo :

Epinefrina en sangre, Norepinefrina en sangre, Dopamina en sangre, Adrenalina en sangre, Noradrenalina en sangre

Examen : CATECOLAMINAS DIFERENCIADAS EN PLASMA