ACIDO FOLICO

DescripciÃ³n

Campos meta
Examen : ACIDO FOLICO
Sinonimo :

FOLATO, COBALAMINA

Tipo De Muestra :

Suero: 500 ul

Estabilidad Y Preparacion :

2 dÃas de 2 â?? 8ÂºC. 1 mes a -20Â°C. Proteger el tubo de la luz. Preguntar al paciente que medicamentos estÃ¡ tomando.

Interferencias :

En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/dÃa) la extracciÃ³n de la muestra no debe efectuarse antes de 8 horas tras la Ãºltima administraciÃ³n.
Esta prueba no se debe realizar en personas que estÃ©n recibiendo metrotexate o leucovorina debido a reactividad cruzada con la proteÃna de fijaciÃ³n del folato.
Muestras hemolizadas son inaceptables.

Dias De Procesamiento : DIARIO
Tiempo Entrega Resultados : DIARIO
Preparacion Del Paciente :

Se requiere ayuno de 6-8 horas.

Utilidad Clinica :

Ã?til para facilitar el diagnÃ³stico de una anemia o de una neuropatÃa (lesiÃ³n en un nervio), para evaluar el estado nutricional de una persona, para monitorizar la eficacia del tratamiento de los dÃ©ficits de vitamina B12 o de folato.
Los niveles sÃ©ricos de folato varÃan en funciÃ³n de la dieta. Los hematÃes o eritrocitos pueden acumular hasta un 95% del folato circulante, y por este motivo puede medirse el folato eritrocitario para detectar deficiencias.
No existe consenso acerca de si es mejor medir el folato sÃ©rico o el eritrocitario.