ACIDO URICO

DescripciÃ³n

Campos meta
Examen : ACIDO URICO
Sinonimo :

Urato

Tipo De Muestra :

Suero/plasma â?? 500 ul y/o orina.

Estabilidad Y Preparacion :

Suero/plasma: 7 dÃas de 2-8Â°C. 6 meses a -20Â°C.
Orina: 4 dÃas de 20-25Â°C.

Interferencias :

Muestras hemolizadas. Hay aumentos fisiolÃ³gicos por el uso de drogas tales como: antineoplasicos, ibuprofeno, Ã¡cido etacrinico, corticosteroides, hidroclorotiazida, etambutol, ciclosporina, pirazinamida, prednisona, propanolol, warfarina, espironolactona, teofilina y ASA.

Dias De Procesamiento : Diario
Tiempo Entrega Resultados : Diario
Preparacion Del Paciente :

No requiere condiciones especiales.

Utilidad Clinica :

Detectar niveles elevados de Ã¡cido Ãºrico en sangre, ya que podrÃan constituir un signo de un trastorno conocido como gota, o para monitorizar los niveles de Ã¡cido Ãºrico cuando se estÃ¡ sometido a quimioterapia o a radioterapia.
TambiÃ©n para detectar niveles elevados de Ã¡cido Ãºrico en orina en la evaluaciÃ³n de la litiasis (formaciÃ³n de piedras, cÃ¡lculos) renal y como monitorizaciÃ³n del tratamiento de la gota en individuos con propensiÃ³n a formar cÃ¡lculos renales.