ACIDO URICO

Descripción

Campos meta
Utilidad Clinica :

Detectar niveles elevados de ácido úrico en sangre, ya que podrían constituir un signo de un trastorno conocido como gota, o para monitorizar los niveles de ácido úrico cuando se está sometido a quimioterapia o a radioterapia.
También para detectar niveles elevados de ácido úrico en orina en la evaluación de la litiasis (formación de piedras, cálculos) renal y como monitorización del tratamiento de la gota en individuos con propensión a formar cálculos renales.

Preparacion Del Paciente :

No requiere condiciones especiales.

Tiempo Entrega Resultados : Diario
Dias De Procesamiento : Diario
Interferencias :

Muestras hemolizadas. Hay aumentos fisiológicos por el uso de drogas tales como: antineoplasicos, ibuprofeno, ácido etacrinico, corticosteroides, hidroclorotiazida, etambutol, ciclosporina, pirazinamida, prednisona, propanolol, warfarina, espironolactona, teofilina y ASA.

Estabilidad Y Preparacion :

Suero/plasma: 7 días de 2-8°C. 6 meses a -20°C.
Orina: 4 días de 20-25°C.

Tipo De Muestra :

Suero/plasma – 500 ul y/o orina.

Sinonimo :

Urato

Examen : ACIDO URICO