HEPATITIS B â?? anti HBs

DescripciÃ³n

Campos meta
Examen : HEPATITIS B - ANTI HBs
Sinonimo :

Anticuerpo contra el antÃgeno de superficie del virus de la hepatitis B (anti-HBs)

Tipo De Muestra :

Suero â?? 1 mL y/o plasma â?? 1 mL

Estabilidad Y Preparacion :

6 dÃas de 2 â?? 8ÂºC. 3 meses a -20Â°C.

Interferencias :

En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/dÃa) la extracciÃ³n de la muestra no debe efectuarse antes de 8 horas tras la Ãºltima administraciÃ³n.

Dias De Procesamiento : Diario
Tiempo Entrega Resultados : Diario
Preparacion Del Paciente :

No requiere de condiciones especiales.

Utilidad Clinica :

Indica recuperaciÃ³n de la enfermedad e inmunoprotecciÃ³n frente al virus B. Es el Ãºltimo que aparece y lo hace despuÃ©s de aclararse el HBs Ag con un intervalo hasta de 6 meses. La negativizaciÃ³n del HBsAg se sigue de la apariciÃ³n de los anti-HBs, que en la mayorÃa de los casos persisten de por vida. Sin embargo, en algunos pacientes los anti-HBs pueden no detectarse hasta varias semanas o meses, durante un periodo llamado â??periodo ventanaâ?• en el que tampoco se detectan los HBsAg y estÃ¡ definido por la presencia de anticuerpos IgM anti-HBc como Ãºnicos marcadores serolÃ³gicos de infecciÃ³n. Es el Ãºnico marcador serolÃ³gico que presentan las personas vacunadas. Una vez administradas las tres dosis de la vacuna, debe realizarse una determinaciÃ³n de estos anticuerpos tras 1-2 meses de la Ãºltima dosis. Se considera una adecuada respuesta inmune cuando el tÃtulo es superior a 10 UI/ml. AÃ±os despuÃ©s de la vacunaciÃ³n el tÃtulo de anticuerpos puede disminuir a valores indetectables sin que ello signifique un cambio en el estatus inmune del individuo.