ANTICUERPOS ANTITIROGLOBULINA (ANTI-TG)

DescripciÃ³n

Campos meta
Examen : Anticuerpos antitiroglobulina
Sinonimo :

Anti- TG

Tipo De Muestra :

Suero/plasma 500 uL

Estabilidad Y Preparacion :

3 dias a 2-8ÂºC. 1 mes a -20ÂºC.

Interferencias :

En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/dÃa) la extracciÃ³n de la muestra no debe efectuarse antes de 8 horas tras la Ãºltima administraciÃ³n.

Dias De Procesamiento : Diario
Tiempo Entrega Resultados : Diario
Preparacion Del Paciente :

No requiere condiciones especiales.

Utilidad Clinica :

Los anticuerpos antitiroglobulina pueden llevar a la destrucciÃ³n de la glÃ¡ndula tiroides y es mÃ¡s probable que aparezcan despuÃ©s de una lesiÃ³n o hinchazÃ³n (inflamaciÃ³n) de dicha glÃ¡ndula. Los anticuerpos antitiroglobulina tambiÃ©n se miden en cualquier momento que se mida el nivel de tiroglobulina; pueden ser detectados en un 40% a 70% de pacientes con tiroiditis crÃ³nica; pueden tambiÃ©n presentarse en un 70% de pacientes hipotiroideos, en un 40% de pacientes con enfermedad de Graves y un pequeÃ±o nÃºmero de pacientes con otras condiciones autoinmunes, particularmente con anemia perniciosa. TÃtulos normales de anticuerpos anti-tiroglobulina no excluyen una tiroiditis de Hashimoto.