ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE â?? PSA LIBRE

DescripciÃ³n

Campos meta
Examen : ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE - PSA LIBRE
Sinonimo :

ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO LIBRE â?? PSA LIBRE

Tipo De Muestra :

Suero â?? 500 o Plasma â?? 500 ul

Estabilidad Y Preparacion :

5 dÃas de 2 â?? 8ÂºC. 3 meses a -20Â°C.

Interferencias :

En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/dÃa) la extracciÃ³n de la muestra no debe efectuarse antes de 8 horas tras la Ãºltima administraciÃ³n.

Dias De Procesamiento : DIARIO
Tiempo Entrega Resultados : DIARIO
Preparacion Del Paciente :

La muestra deben ser tomada antes de biopsia, prostatectomÃa, masaje prostÃ¡tico o examen rectal digital, estos procedimientos aumentan los niveles del PSA hasta por tres semanas.

Utilidad Clinica :

El riesgo de cÃ¡ncer aumenta si la relaciÃ³n entre PSA libre y PSA total es menor al 25%. Mientras menor sea la proporciÃ³n, mayor es la probabilidad de tener cÃ¡ncer prostÃ¡tico.