ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO â?? PSA

DescripciÃ³n

Campos meta
Examen : ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO - PSA
Sinonimo :

PSA Total

Tipo De Muestra :

Suero â?? Plasma: 500 ul

Estabilidad Y Preparacion :

5 dÃas de 2 â?? 8Â°C. 6 meses a -20Â°C.

Interferencias :

En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/dÃa), no recoger la muestra antes de transcurridas como mÃnimo 8 horas tras la Ãºltima administraciÃ³n.

Dias De Procesamiento : Diario
Tiempo Entrega Resultados : Diario
Preparacion Del Paciente :

La muestra deben ser tomada antes de biopsia, prostatectomÃa, masaje prostÃ¡tico o examen rectal digital, estos procedimientos aumentan los niveles del PSA hasta por tres semanas.

Utilidad Clinica :

Para detectar el cÃ¡ncer de prÃ³stata en varones (aunque no existe consenso acerca de su utilidad en varones asintomÃ¡ticos), como ayuda en la decisiÃ³n de realizar o no una biopsia de prÃ³stata, para monitorizar la efectividad del tratamiento del cÃ¡ncer de prÃ³stata y para la detecciÃ³n de recidiva del cÃ¡ncer de prÃ³stata.