CORTISOL EN SALIVA

DescripciÃ³n

Campos meta

Examen : Cortisol en saliva
Sinonimo :

Cortisol salival

Tipo De Muestra :

Saliva

Estabilidad Y Preparacion :

24 horas de 20 â?? 25 Â°C
4 dÃas de 2 â?? 8 Â°C
1 aÃ±o a menos 20Â°C

Interferencias :

Cualquier sangrado bucal al momento de la recolecciÃ³n de la muestra invalida la prueba

Dias De Procesamiento : Diario
Tiempo Entrega Resultados : Diario
Preparacion Del Paciente :

Favor seguir las siguientes indicaciones, de la calidad de la muestra colectada depende que lo resultados sean correctos:

-No fume, mastiqeu chicle, tome (excepto agua) o coma 60 minutos antes de la recolecciÃ³n, preferiblemente recolectar la muestra en ayunas.

-No cepillarse ni usar enjuague buscal 30 minutos antes.

-Para evitar contaminaciÃ³n, no use cremas o inhaladores que contengan esteroides antes de colectar la muestra.

-No haga ninguna actividad que cause que las encÃas de su boca sangren antes de colectar la muestra.

-No consuma antes de colectar la muestra estimulantes salivales como Ã¡cido ascÃ³rbico.

Identifique cada frasco con el nombre completo de paciente, hora y fecha de la recolecciÃ³n. LÃ¡vese las manos antes de manipular el dispositivo.
El frasco contiene un cilindro de algodÃ³n. Abrir la tapa del frasco y retirar con cuidado el cilindro; colocarlo en la lengua y rotarlo por encima y por debajo de la misma por 2 minutos aproximadamente o masticarlo suavemente, para estimular la secreciÃ³n de saliva. Devolver el cilindro del algodÃ³n al frasco y taparlo hermÃ©ticamente.

Si la toma de muestra es en la noche, favor mantener la muestra refrigerada hasta la entrega de esta en el laboratorio.

Utilidad Clinica :

El cortisol en la saliva determina de manera mÃ¡s exacta las concentraciones de cortisol libre activa que el cortisol sÃ©rico. Su mediciÃ³n es particularmente Ãºtil en niÃ±os, pacientes psiquiÃ¡tricos y en sujetos con una gran variedad de factores de estrÃ©s que afectan la corteza adrenal, causando incrementos en la concentraciÃ³n de esteroides adrenales; muchos autores postulan que el cortisol salival ofrece mayor sensibilidad y especificidad que el cortisol libre urinario de 24hs en el diagnÃ³stico