EPSTEIN BARR IgG â?? IgM (VCA)

DescripciÃ³n

Campos meta
Examen : EPSTEIN BARR IgG - IgM (VCA)
Sinonimo :

Ac. Contra el AntÃgeno de CÃ¡pside: VCA, VEB ACV-IgM Ac, VEB ACV-IgG

Tipo De Muestra :

Suero â?? 500 ul

Estabilidad Y Preparacion :

7 dÃas de 2â??8Â°C. 1 mes a -20Â°C.

Interferencias :

Muestra hemolizadas y lipÃ©micas interfieren en la prueba.

Dias De Procesamiento : Diario
Tiempo Entrega Resultados : Diario
Preparacion Del Paciente :

No requiere de condiciones especiales

Utilidad Clinica :

Para facilitar el diagnÃ³stico de la mononucleosis; para evaluar la susceptibiliad a la infecciÃ³n por virus Epstein-Barr (VEB); para distinguir entre una infecciÃ³n por VEB y otras enfermedades que pueden cursar con sÃntomas similares. Cuando se tiene sÃntomas de mononucleosis pero la prueba para la mononucleosis es negativa; cuando una mujer embarazada tiene sÃntomas similares a los de la gripe; en algunas ocasiones en personas asintomÃ¡ticas que han estado expuestas a la mononucleosis.