EXTENDIDO DE SANGRE PERIFERICA

DescripciÃ³n

Campos meta
Examen : EXTENDIDO DE SANGRE PERIFERICA
Sinonimo :

Frotis de sangre perifÃ©rica , ESP.

Tipo De Muestra :

Sangre total con EDTA : 500 ul

Estabilidad Y Preparacion :

1 dÃa de 2 â?? 8 Â°C. Guardar la proporciÃ³n correcta sangre-anticoagulante. Si la muestra no va a ser tomada en laboratorio preferiblemente enviar la sangre.

Interferencias :

â??

Dias De Procesamiento : Diario
Tiempo Entrega Resultados : Diario
Preparacion Del Paciente :

No requiere condiciones especiales.

Utilidad Clinica :

Para evaluar si los hematÃes, los leucocitos y las plaquetas son normales tanto en nÃºmero como en su morfologÃa. Para distinguir entre los distintos tipos de cÃ©lulas de la seria blanca (leucocitos) y establecer su porcentaje relativo en sangre. Para diagnosticar toda una variedad de trastornos y enfermedades que repercuten sobre la producciÃ³n, la funciÃ³n y la destrucciÃ³n de las cÃ©lulas sanguÃneas. Para monitorizar la producciÃ³n celular y el grado de madurez celular en enfermedades como la leucemia, y durante la quimioterapia y/o la radioterapia, y en la evaluaciÃ³n de variantes de la hemoglobina (hemoglobinopatÃas). Cuando el hemograma es anÃ³malo se realiza una extensiÃ³n de sangre para determinar si existen cÃ©lulas anÃ³malas o inmaduras. Cuando el mÃ©dico sospecha que alguna deficiencia, enfermedad o trastorno pueden estar afectando la producciÃ³n de las cÃ©lulas sanguÃneas. TambiÃ©n cuando se sigue un tratamiento que puede repercutir sobre la producciÃ³n de las cÃ©lulas sanguÃneas.