PROLACTINA

DescripciÃ³n

Campos meta
Examen : PROLACTINA
Sinonimo :

PRL

Tipo De Muestra :

Suero â?? 1mL

Estabilidad Y Preparacion :

14 dÃas de 2â??8ÂºC. 6 meses a -20Â°C.

Interferencias :

En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/dÃa), la extracciÃ³n de la muestra no debe efectuarse antes de 8 horas tras la Ãºltima administraciÃ³n. Muchos de los medicamentos, especialmente los utilizados para el tratamiento de los trastornos psicolÃ³gicos o psiquiÃ¡tricos, la presiÃ³n arterial alta (hipertensiÃ³n) y los dolores, tambiÃ©n pueden aumentar la secreciÃ³n de prolactina.

Dias De Procesamiento : Diario
Tiempo Entrega Resultados : 48 horas
Preparacion Del Paciente :

La muestra debe tomarse durante las primeras tres horas de levantado y ademÃ¡s no haber realizado ningÃºn tipo de ejercicio fÃsico. Las concentraciones varÃan a lo largo de las 24 horas, aumentando durante las horas de sueÃ±o con un pico por la maÃ±ana. Idealmente, la extracciÃ³n de la muestra deberÃa realizarse aproximadamente dos horas despuÃ©s de despertarse.

Utilidad Clinica :

En galactorreas, como prueba de funciÃ³n pituitaria, para diagnÃ³stico de tumores pituitarios (macro y microadenomas).