PRUEBA DE COOMBS DIRECTO

DescripciÃ³n

Campos meta
Examen : PRUEBA DE COOMBS DIRECTA
Sinonimo :

Prueba directa de antiglobulina humana, Coombs directo

Tipo De Muestra :

Sangre total EDTA â?? 2 mL

Estabilidad Y Preparacion :

1 dÃa de 2â??8ÂºC.

Interferencias :

Preguntar si el paciente estÃ¡ tomando algÃºn medicamento. Esta prueba puede presentar falsos positivos tras la ingestiÃ³n de los siguientes medicamentos: Ã¡cido amino salicÃlico, ampicilina, cefotetan, cefoxitina, clorpromazina, clorpropamida, dipirona, etosuximida, hidralazina, isoniazina, levodopa, Ã¡cido mefenamÃnico, meticilina, penicilina, melfalan, fenilbutazona, fenitoÃna, procainamida, quinidina, streptomicina, sulfonamidas, tolbutamida, globulina inmune .

Dias De Procesamiento : Diario
Tiempo Entrega Resultados : Diario
Preparacion Del Paciente :

No requiere de condiciones especiales.

Utilidad Clinica :

Para conocer la causa de una anemia hemolÃtica, para investigar una reacciÃ³n transfusional, y para diagnosticar la enfermedad hemolÃtica en el reciÃ©n nacido. Si se presentan sÃntomas sugestivos de una anemia hemolÃtica, como cansancio inexplicable, dificultad para respirar al hacer ejercicio, emisiÃ³n de orina de color oscuro; tambiÃ©n si se tiene niveles de hemoglobina o de hematocrito inesperadamente bajos, o si despuÃ©s de haber recibido una transfusiÃ³n sanguÃnea se presenta en un plazo corto de tiempo los sÃntomas expuestos anteriormente.