RUBEOLA IgG â?? IgM

DescripciÃ³n

Campos meta
Examen : RUBEOLA IgG - IgM
Sinonimo :

SarampiÃ³n alemÃ¡n, sarampiÃ³n de los tres dÃas, IgM/IgG anti-rubÃ©ola

Tipo De Muestra :

Suero â?? Plasma: 500 uL

Estabilidad Y Preparacion :

3 semanas de 2â??8ÂºC. 3 meses a -20Â°C.

Interferencias :

En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (>5 mg/dÃa), la extracciÃ³n de la muestra no debe efectuarse antes de 8 horas tras la Ãºltima administraciÃ³n.

Dias De Procesamiento : Diario
Tiempo Entrega Resultados : Diario
Preparacion Del Paciente :

No requiere de condiciones especiales.

Utilidad Clinica :

Para conocer si se poseen anticuerpos que protejan frente al virus de la rubÃ©ola. Para confirmar una infecciÃ³n antigua o detectar una infecciÃ³n reciente. Antes de un embarazo o al inicio del mismo para confirmar el estado inmunitario. Cuando una mujer embarazada presenta sÃntomas de rubÃ©ola, como fiebre o erupciÃ³n cutÃ¡nea. Cuando un reciÃ©n nacido muestra signos de desarrollo anormal o defectos congÃ©nitos que pueden ser atribuidos a una infecciÃ³n intrauterina. Cuando existe la necesidad de confirmar una infecciÃ³n reciente por rubÃ©ola o de comprobar el estado inmunitario.