VITAMINA B12

DescripciÃ³n

Campos meta
Examen : VITAMINA B12
Sinonimo :

Cobalamina, cianocobalamina

Tipo De Muestra :

Suero y/o plasma â?? 500 uL

Estabilidad Y Preparacion :

2 dÃas de 2â??8ÂºC. 2 meses a -20Â°C. Mantener el suero protegido de la luz.

Interferencias :

En pacientes en tratamiento con altas dosis de biotina (> 5 mg/dÃa), la extracciÃ³n de la muestra no debe efectuarse antes de 8 horas tras la Ãºltima administraciÃ³n.

Dias De Procesamiento : Diario
Tiempo Entrega Resultados : Diario
Preparacion Del Paciente :

No requiere de condiciones especiales.

Utilidad Clinica :

Para facilitar el diagnÃ³stico de una anemia o de una neuropatÃa (lesiÃ³n en un nervio), para evaluar el estado nutricional del paciente, para monitorizar la eficacia del tratamiento de los dÃ©ficits de vitamina B12 o de folato. Cuando los glÃ³bulos rojos estÃ¡n aumentados de tamaÃ±o, cuando hay sÃ-ntomas de anemia o neuropatÃa, cuando se estÃ¡ bajo tratamiento por un dÃ©ficit de vitamina B12 o de folato.